

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 giugno 2016.

**Rettifica del decreto 23 maggio 2016 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario «Prolectus 50 WG».**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il decreto dirigenziale 23 maggio 2016, con il quale l'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S, con sede legale in Parc d'Affaires de Crécy 2, Rue Claude Chappe 69771 Saint Didier au Mont d'Or Cedex Lione (Francia), è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PROLECTUS 50 WG registrato al n. 15549;

Vista la nota del 31 maggio 2016 con la quale l'Impresa ha segnalato che nel testo del decreto sopra citato e nell'etichetta allegata è stata erroneamente indicata la sede legale dell'Impresa medesima, da indicarsi in 10 A, Rue de la Voie Lactée, Saint-Didier-Au-Mont-D'Or (Francia);

Vista la successiva nota dell'8 giugno 2016 con la quale l'Impresa ha segnalato, altresì, che il volume di irrorazione per l'impiego su fragola riportato in etichetta risulta non coerente con la prevista dose di prodotto per ettaro;

Sentito l'Istituto valutatore che ha espresso parere favorevole alla variazione del volume di irrorazione da 7,5 hl/ha in 10 hl/ha relativamente all'impiego su fragola;

Ritenuto di dover rettificare il decreto di autorizzazione del prodotto in questione, compresa l'etichetta che ne costituisce parte integrante, modificando sia l'indicazione della sede legale che quella relativa al volume di irrorazione su fragola ora previsto in «10 hl/ha» analogamente alle ulteriori colture autorizzate;

Decreta:

Il decreto dirigenziale 23 maggio 2016 concernente «Autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario PROLECTUS 50 WG dell'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., ai sensi dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1107/2009» è rettificato come di seguito riportato:

la sede legale dell'Impresa è «10 A, Rue de la Voie Lactée, Saint-Didier-Au-Mont-D'Or (Francia)»;

dal testo dell'etichetta è eliminata l'indicazione «Su fragola la dose d'impiego si riferisce a trattamenti con volume d'acqua di 7,5 hl».

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile di etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.


Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto di rettifica sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it), nella sezione «Banca dati».

Roma, 21 giugno 2016

*Il direttore generale:* RUOCCO



**PROLECTUS™ 50 WG**

(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

FUNGICIDA

PER LA LOTTA CONTRO LA MUFFA GRIGIA DI VITE, FRAGOLA E COLTURE ORTICOLE COLTIVATE IN SERRA E PER IL CONTROLLO DELLA MONILIA DI PESCO, NETTARINE E ALBICOCCO  
Meccanismo d'azione: FRAC G17

PROLECTUS 50 WG Registrazione del Ministero della Salute n. .... del  
COMPOSIZIONE:

Fenpyrazamine g 50

Coformulanti q. b. a g 100

Partita n. ....

™ Trade mark Sumitomo Chemical Company

Stabilimenti di produzione:

ISAGRO SpA - Via Nettunense Km 23,400 - Aprilia (LT)

SBM-Formulation

CS 621 av. Jean Foucault - F-34533 Beziers (Francia)

INDALVA S.L.

Ctra de la Matanza Km 0,5 - E-03300 Orihuela (Alicante) Spagna

**ATTENZIONE**

**SUMITOMO CHEMICAL AGRO  
EUROPE S.A. S**

Parc d'Affaires de Crécy  
10A Rue de la Voie Lactée

69370 Saint-Didier-Au-Mont-D'Or (Francia)  
Tel. +33 478643260

Distribuito da:

SUMITOMO CHEMICAL ITALIA Srl  
Via Caldera, 21 - Milano - Tel. 02 45280.1

Contenuto: 0,250-0,5-1-1,2-2,4-3-5 KG

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:

- 5 metri dalle acque superficiali, per la vite da vino e da tavola;
- 10 metri dalle acque superficiali per pesco, nettarine e albicocco.

Attenzione: Conservare in ambiente fresco, asciutto e ben ventilato.

**INFORMAZIONI MEDICHE**

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

**CARATTERISTICHE**

Fungicida per il controllo della Botrite della vite della fragola e delle colture orticole (pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, cetriolino e zucchini) coltivate in serra, e per il controllo della Monilia del pesco, delle nettarine e dell'albicocco. Il prodotto non è sistemico sebbene presenti attività transaminare.

**DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO**

**POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, CETRIOLO, ZUCCHINO (in serra):** contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) intervenire alle dosi riportate in tabella iniziando i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Rispettare le condizioni d'uso riportate in tabella, adottando un intervallo fra i trattamenti di 10 -12 giorni, in funzione della pressione della malattia.

**VITE DA TAVOLA E DA VINO:** contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) si consiglia un trattamento in pre-chiusura del grappolo o uno all'inviatura o in pre-raccolta alla dose riportata in tabella. Per evitare l'insorgenza di popolazioni del fungo resistenti eseguire un solo trattamento per anno con questo o altri prodotti con stesso meccanismo d'azione, alternando annualmente con prodotti a diverso meccanismo d'azione.

**FRAGOLA (in campo e in serra):** contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) intervenire alle dosi riportate in tabella, iniziando i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Si raccomanda di limitare il numero di trattamenti con questo, o altri prodotti con lo stesso meccanismo d'azione, al massimo ad un terzo delle applicazioni complessivamente previste contro *Botrytis*, in ogni caso non eseguire più di 3 trattamenti per anno con questo o altri prodotti con stesso meccanismo d'azione e rispettare un intervallo minimo fra i trattamenti di 7 giorni.

**PESCO, NETTARINE, ALBICOCCO:** Contro Moniliosi (*Monilia spp.*) intervenire alle dosi riportate in tabella iniziando i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Rispettare le condizioni d'uso riportate in tabella Per evitare fenomeni di resistenza alternare con altri prodotti a diverso meccanismo d'azione.

Per evitare l'insorgenza di popolazioni del fungo resistenti è necessario rispettare il numero massimo di interventi per anno indicato in tabella utilizzando questo o altri prodotti con lo stesso meccanismo d'azione e alternare con prodotti a meccanismo d'azione diverso.

Bagnare accuratamente ed uniformemente la vegetazione da proteggere. Le dosi d'impiego (g/hl) indicate in tabella si riferiscono a trattamenti con volumi d'acqua di 10 hl/ha; con volumi di acqua inferiori o superiori a 10 hl/ha fare riferimento alle dosi ad ettaro. Non applicare il prodotto consecutivamente e alternarlo con altri a diverso meccanismo d'azione

Adottare le dosi più alte e l'intervallo più breve con elevata pressione della malattia.

**Preparazione della miscela:** Riempire a metà con acqua il serbatoio dell'irroratrice e mettere in funzione l'agitatore, quindi introdurre il quantitativo di prodotto previsto e completare il riempimento con acqua. Durante la distribuzione mantenere la massa in agitazione.

Il prodotto va utilizzato da solo

COLTURA	MALATTIA	DOSE g/hl	DOSE kg/ha	Numero massimo di trattamenti per anno	Intervallo minimo tra i trattamenti
Orticole in serra: Pomodoro, Melanzana, Peperone, Cetriolo, Zucchini	Muffa grigia ( <i>Botrytis cinerea</i> )	80-120	0,8-1,2	3	10-12 giorni
		100	1	1	---
		80-120	0,8-1,2	1-3 (*)	7
Vite da vino e da tavola	Moniliosi di rami e fiori; Moniliosi del frutto; ( <i>Monilia spp.</i> )	80-120	0,8-1,2	3	7
Fragola					

(\*) nel caso in cui siano previsti complessivamente 3 trattamenti fitosanitari contro *Botrytis cinerea* eseguire 1 solo trattamento con questo prodotto e i restanti 2 trattamenti con prodotti dotati di diverso meccanismo d'azione.

Sospendere i trattamenti: 3 giorni prima della raccolta su pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, zucchini, fragola, pesco, nettarine, albicocco; 14 giorni su vite da vino e 7 giorni su uva da tavola.

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 21 GIU. 2016



**ATTENZIONE**

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI**

**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA**

**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 21 GIU. 2016

16A06324

